

第3回OTC薬、プライマリケアを対象とする薬剤師の臨床判断ワークショップ認定指導者認定試験について

【OTC薬、プライマリケアを対象とする薬剤師の臨床判断ワークショップ認定指導者認定試験について】

日本アプライド・セラピューティクス（実践薬物治療）学会では、OTC薬、プライマリケアを対象とする薬剤師の臨床判断ワークショップ認定指導者の認定を行っております。

認定薬剤師は、頭痛、腹痛、咳・呼吸困難、皮膚・粘膜症状の4症候ワークショップに参加することによって、

(1) 主要4症候(頭痛、腹痛、咳・呼吸困難、皮膚・粘膜症状)に関する薬剤師による臨床判断に取り組み、適切な対処法を提案する考え方を習得していること、

(2) 「OTC薬、プライマリケアを対象とする薬剤師の臨床判断ワークショップ」の企画・運営に加わり、薬剤師、学生を教育できること

を、口頭試験を通じて認定します。

【OTC薬、プライマリケアを対象とする薬剤師の臨床判断ワークショップ認定指導者申請に必要な資格・要件】

以下のすべての資格・要件を満たすこととしています。

(1) 日本国の薬剤師免許を有し、薬剤師として優れた人格と見識を備えていること。業務経験は問わない。

(2) 申請時において本学会正会員であり、かつ会費を完納していること。

(3) 本学会の主催する「OTC薬、プライマリケアを対象とする薬剤師の臨床判断ワークショップ」の主要4症候のワークショップに参加していること。

(4) 本学会の主催する「OTC薬、プライマリケアを対象とする薬剤師の臨床判断ワークショップ」にプリセプターとして1回以上参加していること。

詳細は、OTC薬、プライマリケアを対象とする薬剤師の臨床判断ワークショップ認定指導者制度規定を参照してください。

<http://www.applied-therapeutics.org/page17.html>

【認定試験実施概要】

(1) 試験日 2018年8月5日(日)

(2) 試験開始 10時30分～(受付は10時～)

(3) 試験時間 15分 面接口頭試験

(4) 試験会場 受験票に記載します(東京駅近辺を予定)

【認定申請方法と認定までの概要】

認定申請期間：2018年6月18日(月)～2018年7月2日(月) (必着)

(1) ①申請書

②主要4 症候とプリセプター修了証のコピー

③返信用の82円切手が貼ってある封筒を2枚（封筒の宛先に申請者の住所・氏名を記載）学会事務局まで郵送してください。

郵送先（学会事務局）：

〒100-0003

東京都千代田区一ツ橋 1-1-1

パレスサイドビル

(株)毎日学術フォーラム内

日本アプライド・セラピューティクス学会事務局

OTC 薬、プライマリケアを対象とする薬剤師の臨床判断ワークショップ認定指導者
認定試験担当 まで

(2) 申請書が到着すると、事務局で申請書類を確認した後に、認定審査料納入の口座番号をメールでお知らせします。

その後、学会事務局で入金を確認できた時点で、申請受付が確定します。

平成30年7月14日(土)までに15,000円の認定審査料を納入してください。

申請の確定後に受験票を申請者に送付します。

(3) 面接口頭試験

(4) 合格者は指定口座へ期日までに5,000円を入金していただきます。

(5) 認定証を送付します。

【認定試験見本問題および解答例の掲示】

見本問題として3問を公開します。

① 医療面談の標準的な手順は、1. 自覚症状に関する質問、2. 心理・社会的情報に関する質問、3. 過去（既往歴、服用歴等）に関する質問に分類されます。

このうち、1. 自覚症状に関する質問の手順について、説明してください。

解答

L (Location) (部位) どこが？

Q (Quality) (性状) どのように？

Q (Quantity) (程度) どのくらい？

T (Timing) (時間と経過) いつ？ いつから？

S (Setting) (状況) どのような状況で？

F (Factor) (寛解・増悪因子) どんな具合に悪くなる？ (良くなる？)

A (Associated manifestation) (随伴症状) 同時にどんな症状があるのか？

② 脳血管性障害が疑われ、見逃してはいけない緊急性の高い疾患を3つ挙げてください。

解答

1. くも膜下出血
2. 脳内出血・脳梗塞
3. 脳動静脈奇形破裂
4. 側頭動脈炎
5. 動脈解離 (椎骨動脈解離、内頸動脈解離)

③ 生理の前になると腹部の痛みが強くなると訴える30代女性で、痛みの程度が軽度でOTC で対処すべき場合の薬は何を提案すべきでしょうか？ また、OTC で対処せずに受診を進める場合はどのようなときでしょうか？

解答

(OTC) NSAID s 月経開始の予兆があれば、予防的に服用するとよいでしょう。

(受診) 痛みがひどい場合、NSAID s (OTC 薬)などを服用しても痛みのコントロールが不十分な場合

テキスト：

アルゴリズムで考える薬剤師の臨床判断 症候の鑑別からトリアージまで
昭和大学薬学部薬学教育学 教授 木内 祐二 編 南山堂

ご不明な点がございましたら、下記担当までお気軽にお問い合わせください。

日本アプライド・セラピューティクス (実践薬物治療) 学会事務局
OTC 薬、プライマリケアを対象とする薬剤師の臨床判断ワークショップ認定指導者
認定試験担当 まで

〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサイドビル9階
(株)毎日学術フォーラム内
TEL. 03-6267-4550
FAX. 03-6267-4555
E-mail:ats@mynavi.jp

学会HP : <http://www.applied-therapeutics.org/>